

## Brugsanvisning

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER. MÅ ALDRIG OPLØSES FØR TILSÆTNING.

Opstår der et behov for ekstra klart og indbydende poolvand tilsættes Saniklar Shock Pot f.eks. dagen før et poolparty, eller efter en dag med mange badende.

1. En Saniklar Shock Pot indeholder den mængde klor, der passer til chokkloring af en pool på 45-55 m<sup>3</sup> (8-10 g pr. m<sup>3</sup>).
2. En chokkloring udføres bedst om aftenen. Der må ikke være badende i poolen. Filterpumpen skal køre natten over.
3. Spred den ønskede mængde Saniklar Shock Pot forsigtigt ud over Vandfladen, bedst over den dybe del af poolen.
4. Test vandets klorværdi den følgende dag. Måles frit klor højere end 5 mg/l, ventes med badning, eller der tilsættes antiklor.
5. PH-værdien justeres til 7,0-7,4.
6. Det anbefales at udføre en chokkloring af poolen hver 14. dag i badesæsonen, for at opretholde højeste hygiejne niveau.

**ADVARSEL!** Spild aldrig vand på produktet. Hvis produktet kommer i kontakt med små mængder vand kan det reagere voldsomt. • Brug det medfølgende målebæger til dosering af produktet. Anvend aldrig målebægeret til andre formål. Læg målebægeret tilbage i emballagen, med sikkerhed for at det er fuldstændigt tørt. • Tilsæt aldrig produktet på vandoverfladen samtidig med at badende opholder sig i vandet. • Produktet skal opbevares i et tørt og velventileret lokale ved almindelig rumtemperatur på højst 35°C